Balsamina

Vass3R01s151-155



Collection Vassal-Montpellier

150Mtp28

Ballanning Rolling Co. To Back.

Baldamina = Syrah 1-31A5







5150 .28 DESIGNATION Balsamina = Syrah CLOS 1 PLANCHE 31 RANG A souche 5 Vigueur : 3 PORT : érig - & érig - couché Pédonoule : (L / M - C Millerandage : ) Date de Véraison : 7 8 73 -Date de Maturité: 24.8 73 x + 2 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - (P) : L - M - C BAIE : TG - G - M - P 14 X13 disc. - sph. ellig ov., obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (N) SAVEUR : (5)- m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 2 s2 4 avec pépins - apyrène 83 1 s4 3 JUS :\ inc. /- coloré sX

DESIGNATION Baldamina = Syrah CLOS / PLANCHE 3/ RANG A Souche Vigueur : 3 PORT : éris - ½ éris - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage : 0 Date de Véraison : Date de maturité : 4-9-74 Pourriture :0 GRAPPE : G - M - P - : L - M - O BAIE : TG - G - M - P disc. - Sph. - (1). - ov. obov. - cyl. - fus.

COULEUR: B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR: S - m - ar - fox - herb. CHARGE : 321 s3 2 avec pépins - apyrène s4 2 JUS inc. - coloré

DESIGNATION: Balsamina = Syrah CLOS A PLANCHE 31 RANG A Souche 5 Vigueur: 3 PORT : érig - Couché Nillerandage : O Date de Véraison : 5-8 Date de Naturité: 4.9.75 x +3 Pourriture : 0,5 GRAPPE : (G) - (N) - P : L - (N) - (G) BAIE : TG - G (M) P 17 X 15 disc. - Sph. ell g- ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (N) SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s2 8 avec pépins - apyrène s3 3 s4 2 JUS : inc. - coloré

	! Nombre ! Total	!	DATES					
	d'yeux	27-3	1.4	!	1 . 1	<u>-</u> !		
1	! 2	0	! 0	1	1 1	!		
2	)!		!	1		1		
5	2	0	1 2 x	!		!		
4	2	2	1 2 1	1 0-6	1-h-7:	ha		
5	1		!	I	!!!	+12		

Baldamina: Syrah

Année: 1975

4. 31 A 5

Emplacement ..... Désignation .....

	Nombr		DATES						
		eux! 21.3	124.3	!	<u> </u>	!	-		
1	13	11	: 2 -	Į t	1 !	!			
2	14	1	! 2 -	!					
3	14	ia i	12-	: !	+11	1			
4)	1	!	1	n.l.	24-3-79+	!			
5/	<b>!</b>	!	!	!	1				

! Nombre ! Total		!	DATES!						
	!	d'yeux	122 -3	: 25.3	23-3	1 2.4	17.4	!	
1	1	8	! 0	1 0	! e	! 2	! 5 ×	!	
2	!	4	! 3 >	1 3 *	3 ×	1 4	4 ×	Ţ	
3	1	4	2 ×	13 .	1 4 *	14	14 4	!	
4	!	2	. 0	! 0	0	10	1 0	! !	
5	1	2	10	: 0	. 0	! 0	! 1	!	

0 6 7.4.76

+22

NOM Balsamina

EMPLACEMENT A 31 AS

0-150 28

3R1-A151 ,155

0	100	60					0 15					
Souche	Wbre yeux	Débou début	rrament mi/deb	Nbre grap	Fervi-	Flo: début	raison mi/f		ve début	raison	fin	Maturita
1				3		22.5	24.5	26.5				
3				6	Grappe	: G -	M - B	Dim		Compac	ité	: I ?1-
<i>ą</i> 5				5	Pour : Baie :		3 11	- b Ī		l - Fue		
					Couleu Saveur Pépins	r : B-0	or-Rs- m - a	Rg-N r - fo	Jus	inc -	- col	oré
					Fort:			Vi	igueur	:		

Désignation: Balsamina = syrah

Emplacement: 1-34 A51-4

## (A) BOURGEONNEMENT.

#### Colonne

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

-Callun 72

Désignation: Balsamma = Syrah Emplacement: 1-31A5 A-4

### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 0 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 0- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tournenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 0 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement (1) sillon 2 partiellement 3.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINACE DE LA FLORAISCE.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (?)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

#### (I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - feuelle 5.

Calvo 72

No ordre

Balsamina : Ayrah

Désignation :

1.31 A5

VASSAL

Planche côté Nº

Souche 1 2 3 4 5

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

#### Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 8.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte () - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon ; coloré 7 - vert 6.

### (I) FLEUR

morphologiquement : male 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

-Calvo 72

Désignation: Baldamina = Syrah

Emplacement: 4.31A5A.1

#### FEUILLE ADULTE.

colonne
34 - petito 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté: 3 - révoluté 4 - tourmenté Bley

Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

39 - long 1 - moyen ( ) court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supériour à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Baldamina Syrah Nº d'ordre 1-31A5 Désignation côté Nº souche VASSAL planche GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) -24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pidoncule non visible 7 - visible (8 / long 9. 25 - A pédoncule herbacé (I) mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.) 26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 8. 27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5 27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière () - irrégulière 2. 28 - Forme : discoide 0 - sphéroide I - ellipsoide 2 - ovoide 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant (T)- non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.) 29 - A jus incolore (1)- coloré 2. 33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7)- molle 8. 30 - A saveur neutre (I)- fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. 3I - A pédicelle long I - moyen (2) - court 3) 3I - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. 3I - A bourrelet de couleur verte (7)- rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident I - peu apparent (2). 32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)

33 - De séparation facile (égreneuse)(I)- difficile 2.

Calvo 74

DEWCHINATION /

Balsamina - Syrah 1-31A54-1

# SARHEHT DE VIGHE

: long (0, moyen (2), court (3). : grôle (1), fort (2). moyen : ramifié (1), peu ramifie (2). Sarmont : adhérente avec lenticelles (1), résistante se Ecorce détachant en lames (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (5), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (5) Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Hocuds Mérithalle de longueur moyenne : ......3 cms : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (7), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (6).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (6);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 74

Emplacement: depl 31 A 5 8 - Angle des nervures ..... 1 -(2) - 3. 9 - L1/L ..... 1 - 2 - 3. 11 - Lobes ..... 1 - 3 - 3 - 3 - 9 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3 13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - (2) - 3. 14 - S. pét. (forme) ...... 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. 16 - Dents : forme ..... 0 - 2 - 32 17 - Dents: Méd/B ..... 1 - (2) - 3. 18 - Angle lob. term. ..... 1 - (2) - 3. 19 - Base nerv. (gar. au dég.) .... 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 21 - Angle L<sub>3</sub> EX L<sup>2</sup><sub>3</sub> ......  $\sqrt{y}$  - 2 - 3. 22 - Largeur S.P. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1 - 2 - 3. : (4) - 5. Forme Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Nº d'ordre: 0450.28 Désignation: Balsamina

Origine :

= Syrah

Domergne 81

# Formulaire de description 1/8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année: 2015

Observateur:

CodeVar: 150

CodeIntro: 150Mtp28 Nom Var : Syrah

Emplacement: Vass1R05sP31A

PE	IENOLOGIE
	1

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtre	Rouge	Rouge foncé	rouge

VIGUEUR ET CROISSANCE

Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE

Oiv 450 Degrá de régistence Patrutie granne	très faible ou	movenne	élevée ou	
Oiv 459 Degré de résistance Botrytis grappe	faible	moyenne	très élevée	

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1				1	
2					
3	4	3//3	214	3	
4	6	27/3	31/3	6	
5	6	100 24/3 Not 24	30/3	4	
Moyenne	16	22/3	31/3 +3	13	8

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
215	16/5+2		18/07	23/07+1	24/08/12	

20/07 DV un per arrource

SUIVI DE MATURITE

Dates	10/08	17/08	24/08	
IR	17,50	17,6 17,4 Queri DM	t. ligh	
Valeur papier PH		the ligh		

Remarque:

Formulaire de description 1 / 8 (stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année: 2013

Observateur:

CodeVar: 150

CodeIntro: 150Mtp28

Nom Var : Syrah

Emplacement: Vass1R05sP31A

	Pi	IENOLOGIE				
Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtre	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE Oiv 351 vigueur rameaux (floraison) très faible. Faible Forte Très forte Moyenne croissance prompts-bourgeons (avant absent ou Oiv 352 Faible Moyenne Forte Très forte rognage, ou maturité) très faible.

RESISTANCE

Oiv 459 Degré de résistance Botrytis grappe	très faible ou moyenne laible	élevée ou très élevée
---	-------------------------------	--------------------------

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1		1	- 1		1
2		1	1	1	1
3	3	loon 21/3	25/3	4	
4	10	25/3	38/2 20/2 20/3 1/1	a 21/4 At 2 auras, 5/4:6	Us
5	1	and 21/3	25/3	2	
Moyenne	14	* *	28/3 +4	13	9

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
03/06	06-06		31 1=7	06 108 45	17/09,1	

-	SUIVI DE MATU	RILE			
	Dates	02.09	06 09	12.09	16.09
	IR	18,5	19,5pe	e-A9,75	20.05
	Valeur papier PH				

Remarque:

# Formulaire de description 1/8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2012

Observateur:

Code introduction : 150Mtp28 Nom introduction : Syrah

Emplacement: Vass1R05sP31A

PHENOLOGIE										
Code	Descripteur	1	3	5	7	9				
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive				
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive				
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenn	tardive	très tardive				
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenn	tardive	très tardive				
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive				
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtr	Rouge	Rouge	rouge				

VIGUEUR ET CROISSANCE

Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	Absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE

Oiv 459 Degré de résistance Botrytis grappe	très faible ou moyenne faible	élevée ou très élevée
---	-------------------------------	--------------------------

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	\				1
2	5			1	
3	٤		22/3	2	
4	M	25(3	S2 101 H /3	7	
5	8		25/3	12	
Moyenne	21		26/3-2	21	10

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
	26105_3		19-07	26.070	27 08	

			SUIVIDE	MATURIT	E	+),	
Dates	21.08	27.08					
IR	18-19.12 August	20-21,6.					
Valeur papier PH		Pas d'A.					
		1 . 1					

Remarque: 12.07 = Tout DV. 2 boing ventus.

#### Formulaire de description 1/8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2011

Oiv

306

Observateur:

Rougeâtr

Cépage : Syrah

Code introduction: 150Mtp28

Nom introduction: Balsamina

coloration des feuilles en automne

Emplacement: Vass1R05sP31A

Rouge

Rouge

foncé

on talle

rouge

violet

	PHENOLOGIE										
Code	Descripteur	1	3	5	7	9					
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive					
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive					
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive					
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive					
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive					

VIGUEUR ET CROISSANCE Oiv 351 vigueur rameaux (floraison) très faible. Faible Moyenne Forte Très forte croissance prompts-bourgeons (avant Absent ou Oiv 352 Faible Moyenne Forte Très forte rognage, ou maturité) très faible.

Jaune

 RESISTANCE

 Oiv 459
 Degré de résistance Botrytis grappe
 très faible ou faible
 moyenne
 élevée ou très élevée

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	A we the				
2		\	1/3		
3	2		24/3	1	
4	. 10	3113	3/4	8	
5	6		31/3	6	
Moyenne	18		. 30/3 (+13)	15	8

pti car taille tard Date floraison Date de Taux de véraison Date de Début début moitié nouaison début moitié maturité aoûtement (oiv 302) % (oiv 501) (oiv 303) (oiv 304) (oiv 306) 8-09-M+3 25.07 19.05+ 15 05 11-60-61

Dates 18. 8.11 26-08. 31.08. 8.09.11

IR 17.8-20,2 14.6-19,8 10.8. 20.16,2-184

Valeur papier A energy energy of the paper.

Remarque: DVI Rian & 30 06.

11 06.07+612.07